

Héron garde-bœufs Cattle Egret

Bubulcus ibis

ordre : Pelecaniformes

famille : Ardeidae

Statut de l'espèce :

Directive oiseaux : **annexe II/2**

Convention de Berne : -

Convention de Bonn : -

Convention de Washington : -

Liste rouge UICN : **préoccupation mineure**

Liste rouge : **préoccupation mineure**

Protection nationale : **protégé**



Quelques chiffres :

Effectif en Europe :	230 000
Hivernant en France :	16 470
Effectif moyen en BSB :	152
Importance du site :	0,92%

Responsabilité biologique régionale :
élevé

La première observation en baie de Saint-Brieuc date de 1998. On observe régulièrement 2 ou 3 individus chaque automne ou en début d'hiver. Les Hérons garde-bœufs fréquentent le fond de baie de juillet à mai, mais les effectifs sont maximums en octobre/novembre. En 2010, une dizaine d'individus a été observé, puis 45 en 2016, 84 en 2018, 220 en 2019, 320 en 2020, 560 en 2021, 635 en novembre 2022.

Depuis la fin du XIX^e siècle, le Héron garde-bœufs à une aire de distribution en expansion. Originaire de l'Asie méridionale (Inde, le Pakistan,... jusqu'au Japon) et de l'Afrique tropicale au sud du Sahara, il s'est répandu à travers toute l'Afrique méridionale dès la fin du XX^e siècle. Son aire de reproduction s'est étendue au fur et à mesure à partir de l'Afrique du Nord, en atteignant tout d'abord le nord de la péninsule ibérique en Europe à la fin des années 1930. En France, il apparaît comme nicheur régulier en 1968 en Camargue. Dès 1980, les preuves de nidification sont recensées au lac de Grand Lieu (Loire-Atlantique) avec 2 couples reproducteurs en 1981. En 1984, 2 à 4 couples nicheurs sont notés dans les marais de Brouage en Charente-Maritime, bien que l'espèce y ait probablement niché depuis 1981. Cette lente expansion de l'espèce a été réduite à néant lors de l'hiver très rigoureux de 1984-1985 qui sévit en France, pendant lequel la mortalité a été très importante.

À l'échelle nationale, les effectifs sont en forte augmentation sur la période 1993 à 2022 (Moussy et al., 2022) : +7% sur la période 1993-2021 et +17% sur la dernière décennie. Ainsi, les effectifs lors des comptages Wetlands de 2014 estimaient la population hivernante en France à 6500 individus, contre près de 22 000 en 2022 (Moussy et al., 2022). Les vagues de froid des hivers 2001-2002 et 2002-2003 ont entraîné une réduction drastique des effectifs hivernants.

Effectifs hivernants :

moy. 1998-2022 : 98

moy. 1995-2004 : 4

moy. 2005-2014 : 6

moy. 2015-2022 : 152

moy.max : 635 (22/23)

Effectifs annuels :

moy. 1998-2022 : 126

moy. 1995-2004 : 4

moy. 2005-2014 : 4

moy. 2015-2022 : 154

moy.max : 258 (2022)

Tendances

Europe :

80 ↘ 21

nationale :

93 ↘ 10 ↗ 22

Baie de Saint-Brieuc :

98 → 15 ↗ 22

source :


Wetlands International

Birdlife



RNN Baie de Saint-Brieuc

Héron garde-bœufs

Bubulcus ibis





Evolution des effectifs de Héron garde-bœufs en baie de Saint-Brieuc au cours de l'année. Tendence sur la période 1998-2022.



Indice de variation des effectifs calculé à partir des données Wetlands National et en baie de Saint-Brieuc.

(L'indice I est fixé par la moyenne des effectifs sur la période 2000-2013).

Evolution des effectifs du Héron garde-bœufs en baie de Saint-Brieuc pour la période 2000-2022 à partir des données des comptages Wetlands effectués à la mi-janvier.



Evolution des effectifs moyens du Héron garde-bœufs en baie de Saint-Brieuc pour la période 1996-2022, établie à partir des données des comptages mensuels.